

Über die Gefäßverteilung in der Haut des Unterschenkels beim Menschen

von

EVELIN JOSTEN

Aus der Dermatologischen Klinik und Poliklinik der Universität
München.

Direktor: Professor Dr. A. Marchionini.

Über die Gefäßverteilung in der
Haut des Unterschenkels beim
Menschen.

Inaugural - Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde in der gesamten Medizin

verfaßt und einer Hohen Medizinischen Fakultät der

Ludwig - Maximilians - Universität zu München

vorgelegt von

Evelin J o s t e n

aus

Bamberg.

1 9 5 9



5349/60

Mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät
der Universität München.

Referent: Prof. Dr. W. Spier.

Correferent: Prof. Dr. Marchionini

Dekan: Prof. Dr. Schwiegk

Tag der mündlichen Prüfung: 5.11.59

I n h a l t s a n g a b e .

A. L i t e r a r i s c h e r T e i l .

1. Zur Architektonik der Hautgefäße.
2. Zum mikroskopischen Bau der Hautgefäße.
3. Histologischer Aufbau und Einteilung der Gefäße
 - a. Arterien und Venen
 - b. Arteriovenöse Anastomosen.

B. E i g e n e U n t e r s u c h u n g e n .

1. Fragestellung
2. Material und Methodik
3. Untersuchungsergebnisse tabellarisch und graphisch dargestellt.
 - a. Regio cruris anterior
 - b. Regio cruris posterior
 - c. Arteriovenöse Anastomosen.
4. D i s c u s s i o n d e r B e f u n d e .
 - a. Regio cruris anterior
 - b. Regio cruris posterior
 - c. Arteriovenöse Anastomosen

C. Z u s a m m e n f a s s u n g .

D. S c h r i f t t u m .

E. L e b e n s l a u f .



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41555222_0126

A. L i t e r a r i s c h e r T e i l .

1. Zur Architektonik der Hautgefäße:

Nach S p a l t e h o l z sind bei der Gefäßversorgung der Haut drei Arteriennetze zu unterscheiden:

Die Arterien, die in die S u b c u t i s eintreten, verzweigen sich und bilden auf der Fascie das weitmaschige " f a s c i a l e N e t z ". Dessen Ästchen steigen in das subcutane Fettgewebe auf, teilen sich dort wiederum auf u.z. in der Weise, daß sie der Subcutis / Cutisgrenze zustreben und das " c u t a n e N e t z " bilden, indem sie dort miteinander anastomosieren. Das cutane Netz gibt feine Zweige zu den Papillen ab. Die Äste dieser Zweige anastomosieren miteinander und bilden in der oberen Hälfte des Coriums das engmaschige " s u b p a p i l l ä r e N e t z ".

Diese Anordnung ist aber abhängig von den Bedingungen, die der Haut der einzelnen Körperteile gestellt sind, so daß Aufbau und Dichte variiert. Speziell für die Haut der unteren Extremitäten gilt nach S p a l t e h o l z :

Das engmaschige f a s c i a l e N e t z liegt zum größten Teil direkt der Fascie auf, oder etwas höher in der Subcutis. Es wird von teils sehr feinen, teils stärkeren Ästchen gebildet und ist an der unteren Extremität besonders gut entwickelt. Die Ästchen, die von dem fascialen Netz in die Subcutis ziehen, anastomosieren dort mit anderen benachbarten Gefäßen, bilden ein s u b c u t a n e s N e t z und ziehen von hier aus zur unteren Coriumgrenze. Die zahlreichen Äste, die während dieses langen Verlaufes abgegeben werden, steigen fast senkrecht coriumwärts auf und bilden in bogenförmigen Zweigen an der Cutis / Subcutisgrenze zusammen mit Endverzweigungen der Stämmchen selbst das c u t a n e N e t z. Aus dem cutanen entwickelt sich das s u b p a p i l l ä r e N e t z, das regellos aus viereckigen Maschen aufgebaut ist. Es gibt die Papillaräste ab, die funktionell Endarterien sind. Jede Papille enthält eine Kapillare, die an der Spitze umbiegt und sich unter Erweiterung in den dicken venösen Schenkel fortsetzt,

der an der Basis der Papille in venöse längsverlaufende Gefäß mündet, in das oberflächliche V e n e n n e t z . Aus diesem oberflächlichen Netz ziehen Gefäße schräg abwärts in ein z w e i t e s v e n ö s e s N e t z , das dicht unter dem ersten liegt, aber weitmaschiger ist. Das zweite venöse Netz liegt noch oberhalb des subpapillären arteriellen Netzes. Nur an einigen Stellen des Körpers ist ein d r i t t e s v e n ö s e s N e t z vorhanden. Es liegt zwischen dem arteriellen subpapillären und cutanen Netz und ist durch kleine Begleitvenen ausgezeichnet, die aus den von der Oberfläche herabziehenden Ästen entspringen und innerhalb des Netzes untereinander und mit größeren Venen anastomosieren.

Die Zahl der im Corium liegenden Venen ist bedeutend größer, als die der Arterien.

Das vierte und zugleich größte venöse Netz, das eigentliche c u t a n e N e t z , liegt an der unteren Grenze des Corium und erhält seine Äste aus dem dritten venösen Netz. Hier verlaufen Arterien und Venen getrennt. Man findet an zahlreichen Stellen des cutanen Netzes Klappen. Die Äste dieses Netzes sind die Wurzeln der s u b c u t a n e n V e n e n .

Zusammenfassend besitzt also die Haut nach S p a l t e h o l drei flächenhaft angeordnete, übereinanderliegende, arteriell Anastomosennetze: ein fasciales, cutanes und subpapilläres Netz. Eventuell kann noch ein subcutanes Netz gefunden werden. Aus dem subpapillären Netz, dem obersten der drei arteriellen Netze, steigen Äste auf, die sich als Endarterien in die Papillencapillaren auflösen und deren venöses Blut von Venen gesammelt wird, die ebenfalls flächenhaft übereinander angeordnete Netze bilden. Die Zahl der venösen Netze ist größer. Wir finden vier im Corium und eines in der Subcutis. Die venösen Gefäße sind stärker, zahlreicher und liegen in anderen Ebenen als die arteriellen.

Nach B a r g m a n n speisen die absteigenden Äste des cutanen Netzes die Capillarnetze der subcutanen Fettorgane und seine Coriumzweige die Capillaren der Schweißdrüsen und Haare

An der Corium/ Subcutisgrenze werden die Schweißdrüsenpakete, das cutane Arterien - und das cutane Venennetz als Gefäßdrüsenschicht deutlich, da sie sich im gleichen Niveau erstrecken.

Die Venen der Schweißdrüsen und Fettorgane laufen zum cutanen Venennetz.

2. Zum mikroskopischen Bau der Hautgefäße.

Nach S p a l t e h o l z sind die Venen in den obersten beiden Netzen sehr einfach gebaut. Die Wand besteht nur aus Endothel und Grundhäutchen und unterscheidet sich nicht von den Papillencapillaren. Die Venen der tiefen Netze haben schon vereinzelt zur Gefäßachse quergestellte Muskelfaserkerne, die im dritten Netz immer reichlicher werden, bis auf die Begleitvenen, die noch durch rein capillaren Bau ausgezeichnet sind. Das cutane Netz weist schon eine mehrfache Muskellage auf.

Die A r t e r i e n des cutanen Netzes besitzen kräftige Ringmuskulatur. Die Muscularis nimmt an den zur Oberfläche aufsteigenden Ästen rasch ab, so daß schon in der Mitte des Coriums nur noch eine geschlossene Lage von Muskelzellen und bis zum subpapillären Netz bereits kleine Lücken in der Muskelschicht zu finden sind.

Bargmann, Patzelt, Benninghoff geben im wesentlichen dieselbe Darstellung.

3. Histologie und Einteilung der Gefäße.

a. Arterien und Venen:

Die A r t e r i e n w a n d besteht aus drei Schichten:

Tunica interna oder Intima

Tunica media oder Muscularis

Tunica externa oder Adventitia.

Die Arterien besitzen gegenüber den Venen vor allem eine mächtige aus zirkulär verlaufenden, glatten Muskelfasern und elastischem Gewebe bestehende Tunica media.

Die *Tunica interna* besteht aus Endothel, einer dünnen Lage Bindegewebe und längsverlaufenden elastischen Fasern.


Die *Tunica media* - eine mächtige Muskelhaut mit zirkulär verlaufenden, elastischen Fasern - ist durch eine elastische Membran, die *Elastica interna* und durch eine schwächere *Elastica externa* begrenzt.

Die *Tunica externa* besteht hauptsächlich aus längsverlaufendem fibrillärem Bindegewebe und ebenfalls reichlich elastischen Fasern. Ohne scharfe Grenze geht sie in das umgebende Bindegewebe über.

Die *Blutcapillaren* weisen nur ein Grenzhäutchen aus argyrophilen Fasern und verästelten Zellen mit rundem Kern, die Perizyten, auf.

Die *Arteriolen* besitzen als *Tunica interna* nur das Endothel. Die *Tunica media* besteht aus einer einfachen Lage glatter Muskelzellen, die durch ein ganz feines Häutchen von der Endothelschicht abgegrenzt ist. Man sollte aber nach deutschem Sprachgebrauch nur dann von Arteriolen sprechen, wenn die *Muscularis* lückenhaft ist. Der häufig anzutreffende *Usus*, kleine Arterien als Arteriolen zu bezeichnen, führt leicht zu Mißverständnissen.


Die Arterien, bei denen wir den typischen einfachen dreischichtigen Bau finden mit einer dicken Lage glatter Ringmuskulatur, stellen sich nach *Patzelt* folgendermaßen dar:



Intima
Elastica interna
Muscularis
Elastica externa
Adventitia mit
Fettvacuolen

Abb.1. verändert nach *Patzelt*


Zwischen Membrana elastica interna und dem Endothel kann schon in kleinen Arterien eine allmählich dicker werdende Schicht aus feinen, elastischen Längsfasernetzen und längsverlaufenden glatten Muskelfasern auftreten.



Intima mit
Längsmuskulatur
Media
Adventitia

Abb.2. abgeändert nach Patzelt


Es kann zuweilen innerhalb einer dünnen Ringmuskelschicht zu sehr reichlicher Ausbildung von Längsfasern kommen.



Längsmuskulatur
Ringmuskulatur

Abb.3. Abgeändert nach
P a t z e l t

Auch die Tunica externa weist mitunter längsverlaufende glatte Muskelfasern auf, zusammen mit der Intima.



Intima - Längsmuskulatur
Media
Adventitia- Längsmuskulatur

Abb.4. abgeändert nach P a t z e l t


Die Venen besitzen ein weites, oft zusammengedrücktes Lumen und eine viel dünnere Wand mit vereinzelt Klappen. Auch hier haben wir eine Tunica interna, media und externa, doch können sie nicht so scharf getrennt werden, wie die der Arterien.

Abb. 5. abgeändert
nach
P a t z e l t



Intima
Media
Adventitia


Die Venen unterscheiden sich von den Arterien vor allem durch eine sehr stark entwickelte Tunica externa, die häufig reichlich glatte Längsmuskulatur enthält.



Intima
Media
Adventitia mit
Längsmuskulatur

Abb. 6. abgeändert nach P a t z e l t

Auch die Tunica interna, die aus Endothel, Bindegewebe und feinen elastischen Fasern besteht, besitzt bei vielen Venen besonders der unteren Extremität, reichlich längsverlaufende glatte Muskelfasern.



Intima- Längsmuskulatur
Media
Adventitia-Längsmuskulatur

Abb. 7. abgeändert nach P a t z e l t

b. Arteriovenöse Anastomosen als Sondereinrichtung der Blutstromregulation.

Eine Sonderform der Gefäße sind nach C l a r a , L u c k n e r , B a r g m a n n , P a t z e l t , N ö d l die arteriovenösen Anastomosen. Sie sind von eiförmigem Aussehen und haben ein schmales, unregelmäßiges Lumen. Ihre Wand besteht aus einer dünnen Schicht von zirkulären Muskelfasern, Endothel und mehreren Lagen heller epitheloider Quellzellen, die zur Flüssigkeitsaufnahme und - abgabe befähigt sind und wahrscheinlich Acetylcholin produzieren. Die Elastica interna fehlt. Arteriovenöse Anastomosen sind unmittelbare Verbindungen zwischen arteriellem und venösem Netz, die durch die Verstellbarkeit ihrer Lichtung eine Umgehung des nachgeschalteten Kapillarsystems ermöglichen. Sie sind zusammen mit Sperrarterien und Drosselvenen die wichtigsten Sondereinrichtungen für die Blutstromregulation der Kreislaufperipherie.

Sie haben mannigfache Aufgaben. Der venöse Blutdruck kann wesentlich erhöht und die Temperatur im Venengebiet durch den arteriellen Zustrom gesteigert werden. Die Gefahr der Ödem-bildung im Kapillargebiet wird herabgesetzt.

Wichtig ist ebenfalls, daß eine periodische Verlagerung des Blutstromes von einem Kapillarbereich in einen anderen ermöglicht wird.

B. E i g e n e U n t e r s u c h u n g e n .

1. Fragestellung.

In den hier beschriebenen Untersuchungen soll die Frage angegangen werden, wie die obengenannten Arterien- und Venentypen in den einzelnen Hautschichten verteilt sind, welche Schichten von den einzelnen Typen besonders bevorzugt werden und ob und in welcher Anzahl arteriovenöse Anastomosen vorhanden sind. Es sollen dabei die Cutis/ Subcutisgrenze, sowie folgende Bezirke: intraseptal-oben, intraseptal-mitte, intraseptal unten, intralobär-Zentrum, intralobär-Rand, perifascial-oben, perifascial- unten, subfascial besondere Berücksichtigung finden.

2. Material und Methodik. +)

Es wurden bei 10 Leichen verschiedenen Alters und Geschlechts je zwei Hautstückchen von circa 1,5 - 2 cm Größe aus der Regio cruris anterior (9 cm bzw. 18 cm im Mittel vom unteren Rand der Patella entfernt) und aus der Regio cruris posterior (8 cm bzw. 16 cm von der Fossa poplitea entfernt) entnommen. Die Todesstunde lag niemals länger als 20 Stunden zurück. Die Todesursache schloß bei allen pathologische Gefäßveränderungen aus.

Insgesamt kamen demnach 40 Excisate an folgenden Leichen zur Untersuchung:

1. weiblich, 54 Jahre, Todesursache : Verschlußikterus bei metastasierendem Mammacarcinom
gestorben: 19. 10. 57 - 22.20 Uhr
seziert : 20. 10. 57 - 8.00 Uhr
2. männlich, 24 Jahre, Todesursache : Encephalitis epidemica, Miliartuberculose,
gestorben: 29. 10. 57 - 3.50 Uhr
seziert: 30. 10. 57 - 8.00 Uhr

+) Herrn Prof. BÜNGELER, Direktor des Pathologischen Institutes der Universität München, sei herzlichst für die Erlaubnis von Probeexcisionen gedankt

3. männlich, 44 Jahre, Todesursache : Schädelbasistumor
gestorben: 13. 8. 57 - 18.10 Uhr
seziert: 14. 8. 57 - 8.30 Uhr
4. männlich, 32 Jahre, Todesursache : Hirntumor, beidseitige
Lungenmetastasen,
gestorben : 13. 8. 57 - 16.50 Uhr
seziert : 14. 8. 57 - 8.30 Uhr
5. weiblich, 46 Jahre, Todesursache : beidseitiges Mammacarci
nom mit Metastasen,
gestorben: 11. 8. 57 - 6.10 Uhr
seziert: 12. 8. 57 - 8.00 Uhr
6. männlich, 48 Jahre, Todesursache : Spindelzellsarkom der
unteren Brustwirbelsäule,
gestorben: 17. 8. 57 - 16.15 Uhr
seziert: 19. 8. 57 - 8.30 Uhr
7. männlich, 50 Jahre, Todesursache : Stammhirntumor,
gestorben : 20.10.57 - 19.15 Uhr
seziert: 21.10.57 - 8.00 Uhr
8. weiblich, 47 Jahre, Todesursache : Pancreaskopfcarcinom,
Lungenembolie,
gestorben : 23. 10. 57 - 18.35 Uhr
seziert: 24. 10. 57 - 8.00 Uhr
9. männlich, 53 Jahre, Todesursache : Magencarcinom,
postoperatives Kreislaufversagen,
gestorben: 27. 10. 57 - 14.00 Uhr
seziert: 28. 10. 57 - 8.00 Uhr
10. männlich, 45 Jahre, Todesursache : paralytischer Ikterus
gestorben : 25.10.57 - 10.00 Uhr
seziert: 26.10.57 - 8.00 Uhr

Die vier Hautstückchen der einzelnen Leichen wurden, da sie größtenteils sehr stark entwickeltes subcutanes Fett besaßen, einer langwierigen Fixierung (48-62 Stunden Formalin) und Entwässerung unterworfen.

36 Stunden	in	70 % igem Alkohol	
24	"	80 %	"
48	"	96 %	"
12	"	absolutem	"
18	"	Xylol	(im Brutschrank bei 30 Grad)
18	"	Xylol - Chloroform	(2 : 1)
12	"	weichem Paraffin	
12	"	hartem	"

Erst nach dieser eingehenden Behandlung war es möglich die ziemlich großen und fettreichen Stücke zu schneiden. Die Präparate wurden vor der Fixierung und nach der Entwässerung gemessen. Es zeigt sich dabei eine Schrumpfung von 1 - 2 mm.

Von jedem Block wurden 10 Schnitte angefertigt. Die Schnittdicke wurde 20μ gewählt, bei einem jeweiligen Zwischenraum von circa 120μ - 180μ . Im allgemeinen wurde demnach also von jedem Block ein Gewebsabschnitt von circa 2 mm untersucht. Dieses Vorgehen erwies sich zweckmäßig, nachdem vorher erst mit kleineren Zwischenräumen und kleinerer Schnittdicke und einer größeren Anzahl von Schnitten pro Block gearbeitet wurde.

Die Färbung, die sich an die Paraffineinbettung anschloß, besaß im wesentlichen in der Methode nach van Gieson. Zur Ergänzung wurden noch Hämatoxylin - Eosin - und Elasticafärbungen gemacht.

3. Ergebnisse, tabellarisch und graphisch dargestellt.

Die Ergebnisse über die einzelnen oben beschriebenen Venen- und Arterienarten und ihre Verteilung in den einzelnen Hautabschnitten wurden tabellarisch festgehalten und die Tabellarisch graphisch dargestellt. Von jedem Excisat wurden jeweils zwei der angefertigten Schnitte im Abstand von 1000μ - 1300μ Zwischenraum untersucht.

Die Bezeichnung der Gefäße wurde folgendermaßen gewählt:

- A₁ kleine Arterien mit einer dicken Lage von Ringmuskulatur.
- A₂ mittlere Arterien mit einzelnen Längsmuskelbündeln zwischen Intima und Media, Ringmuskulatur und kollagenen Fasern.
- A₃ Arterien mit s e h r stark entwickelter Längsmuskulatur.
- A₄ Arterien mit i n n e r e r und ä u ß e r e r Längsmuskulatur.

- G₁ kleine Gefäße unbestimmter Art.
- G₂ größere Gefäße unbestimmter Art.

- V₁ kleine Venen mit dünner Lage glatter Ringmuskulatur.
- V₂ Venen mit Längsmuskulatur in der A d v e n t i t i a .
- V₃ Venen mit i n n e r e r und ä u ß e r e r Längsmuskulatur.
- V₄ Venen mit K l a p p e n a n s a t z .

Zuerst wurden die 20 Excisate der

R e g i o c r u r i s a n t e r i o r

untersucht. Das Ergebnis hinsichtlich der Gefäßverteilung ist in den folgenden Diagrammen 1, 2, 3, 4 wiedergegeben. Es wurde aus Tabellen gewonnen, die für jede der Leichen angelegt waren.

Die Tabellen sind folgendermaßen zu verstehen :

In der Senkrechten sind die einzelnen Gefäßarten angeordnet, in der Waagerechten die untersuchten Hautschichten.

Die römischen Zahlen geben den Ort der Excision an.

Die obere Zahlenreihe bedeutet jeweils die gefundene Anzahl der Gefäße im ersten untersuchten Schnitt des betreffenden Excisates, die untere die Anzahl des Schnittes nach 1000 μ - 1300 μ .

Tabelle 1.

weiblich, 54 Jahre, Todesursache : Verschlußikterus bei metastasierendem Mammacarcinom.

gestorben: 19.10.57 - 22,20 Uhr

seziert: 20.10.57 - 8.00 "

Länge des Unterschenkels: 38 cm

Regio cruris anterior (rechts):

I. 19 cm vom unteren Rand der Patella entfernt

II. 8 cm " " " " " "

Regio cruris posterior (rechts):

III. 21 cm von Fossa poplitea entfernt,

IV. 10 cm " " " "

	Cutis/ Subcutis				Intraseptal			Intralobär		Perifascial		subfa				
					oben	mitte	unten	Zentrum	Rand	oben	unten					
	I	II	III	IV	<u>I</u> <u>II</u> <u>III</u> <u>IV</u>	<u>I</u> <u>II</u> <u>III</u> <u>IV</u>	<u>I</u> <u>II</u> <u>III</u> <u>IV</u>	<u>I</u> <u>II</u> <u>III</u> <u>IV</u>	<u>I</u> <u>II</u> <u>III</u> <u>IV</u>	<u>I</u> <u>II</u> <u>III</u> <u>IV</u>	<u>I</u> <u>II</u> <u>III</u> <u>IV</u>	I	II			
A ₁	3 0	4 0	5 0	2 0	1	1231	312	7	4	1	1	2	22	1	1	
A ₂	0 1		3 2		1	1	11		2			1	1			
A ₃						2	1		1		1	1				
A ₄	1 1				1					1	11	2				
G ₁											1 1					
G ₂						1										
V ₁	6 0	3 0	2 0	2		1211		12	5	142	2	1	3	22		
V ₂	1 3	1 4	2 1	1 3	1	1	1	1	2	1	11	1	1		11	
V ₃	1 1	1 1	1		1			11		11	1					
V ₄											1					

Tabelle 3.

männlich, 44 Jahre, Todesursache: Schädelbasistumor,
gestorben : 13.8.57 - 18.10 Uhr
seziert : 14.8.57 - 8.30 "
Länge des Unterschenkels : 40 cm

Regio cruris anterior , links :

I. 10 cm vom unteren Rand der Patella entfernt,

II. 6 cm " " " " " "

Regio cruris posterior, rechts:

III. 11 cm von Fossa poplitea entfernt,

links:

IV. 14 cm von Fossa poplitea entfernt.

	Cutis/ Subcutis	Intraseptal			Intralobär		Perifascial		Subfasci
		oben	mitte	unten	Zentrum	Rand	oben	unten	
	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV
A ₁	1 3 5 2 2 2 4 1	5 5 4 6	2 5 2 1 6	2 5 1 1 6	1 2 1 0 1 1 8	1 1 2 1 1 1	2 1 5 2 1 4	2 1 5 3 1 4	1 1 1
A ₂	1 1 2 1 1 1 2		1 1	1 1			1 1 1 1		
A ₃			1 1 1 1 1	2 1	1		2 2		
A ₄		2 3							
G ₁									
G ₂									
V ₁	2 1 1 1 1 1 1 1	5 6 6 5	1 1	1 1 2 1 1	2 1 5 3 1 4	2 1	2 1 1 5 1 2 1 6	1 1 1	1 1 1
V ₂	2 1 2 3 2 1 2 2	1 1 2 1 1 2	2 2 1 1	4 7 2 2 7		1 2		1	
V ₃				1 1 1 1					
V ₄		1 1							

III. 11 cm von der Fossa poplitea entfernt.

[illegible]

Diagramm 1.

Hier sind die einzelnen Arterientypen pro cm Schnittlänge im Mittel und ihre Häufigkeit in den einzelnen Hautschichten berechnet und dargestellt. Das Diagramm zeigt wie die einzelnen Arterientypen in der Haut der *Regio cruris anterior* verteilt sind.





Diagramm 2

zeigt die Verteilung der einzelnen Venentypen in der Haut der *Regio cruris anterior*.



In den einzelnen Hautabschnitten ist die Häufigkeit der einzelnen Gefäße folgendermaßen:

Diagramm 3 - A r t e r i e n .





Diagramm 4 - V e n e n .



In Diagramm 5

ist das Ergebnis für die Verteilung der einzelnen Artertypen in der Regio cruris posterior dargestellt:





Diagramm 6 :

Die einzelnen Venentypen sind folgendermaßen auf die Hautabschnitte der Regio cruris posterior verteilt:



In den einzelnen Hautabschnitten der Region cruris posterior ist die Häufigkeit der einzelnen Gefäße folgendermaßen:

Diagramm 7 - A r t e r i e n .





Diagramm 8 - V e n e n .



c. Ergebnis der Untersuchungen über das Vorhandensein von
arteriovenösen Anastomosen.

Hinsichtlich der arteriovenösen Anastomosen an der Haut des Unterschenkels wurde folgendes Ergebnis gefunden:

Bei 53 Excisaten (1,5 cm - 2 cm), die von 10 Leichen aus der Regio cruris anterior und posterior entnommen und zu 500 Schnitten verarbeitet wurden, fanden sich 3 arteriovenöse Anastomosen u.z. 2 in der Regio cruris posterior und 1 in der Regio cruris anterior. Damit werden die Untersuchungsergebnisse von C l a r a bestätigt, der ebenfalls nur eine äußerst geringe Anzahl von arteriovenösen Anastomosen an der Unterschenkelhaut des Menschen fand.

4. D i s c u s s i o n d e r B e f u n d e .

Hinsichtlich Alter, Geschlecht und Gefäßarchitektonik in den einzelnen Hautabschnitten konnten keine auffälligen Korrelationen gefunden werden.

a. Zuerst wurde die R e g i o c r u r i s a n t e r i o r untersucht : Die statistische Auswertung der Befunde zeigt, daß in weitaus größter Zahl kleine Arterien mit einer dicken Lage von Ringmuskulatur (A 1) und kleine Venen mit glatter Ringmuskulatur (V 1) in allen Schichten, besonders aber an der Cutis / Subcutisgrenze vorhanden sind. In weiteren Untersuchungen, in denen besonders auf den histologischen Aufbau der einzelnen Arterien und Venen und deren Verteilung auf die einzelnen Hautschichten eingegangen wurde, sind A₁ und V₁ vernachlässigt.

1. In Diagramm 1 ist die Anzahl der einzelnen A r t e r i e a r t e n pro cm Schnittlänge im Mittel und ihre Häufigkeit in den einzelnen Hautschichten berechnet und graphisch dargestellt. Es geht daraus hervor, daß die einzelnen Arterientypen folgendermaßen in der Haut verteilt sind:

- A_2 - mittlere Arterie mit einzelnen L ä n g s m u s k e l -
b ü n d e l n zwischen Intima und Media - ist am weitaus
häufigsten an der Cutis / Subcutisgrenze vertreten, dann
folgt der Anteil in den unteren Septen und wieder mit
einigem Abstand das Gebiet über der Fascie. Subfascial,
in den mittleren und oberen Septen und intralobär
(Zentrum) ist A_2 nur in geringer Anzahl vertreten,
während dieser Typ unterhalb der Fascie und in den Sub-
cutisläppchen am Rand nicht gefunden wurde.
- A_3 - Arterie mit s e h r stark entwickelter L ä n g s -
m u s k u l a t u r - ist ebenfalls häufig vorhanden,
mit zahlenmäßigem Maximum in den mittleren Septen und
zentral-intralobär. Sonst ist A_3 ungefähr gleichmäßig ver-
teilt, nur subfascial erreicht die Kurve die O-Linie.
- A_4 - Arterie mit i n n e r e r und ä u ß e r e r L ä n g s -
m u s k u l a t u r - ist in viel geringerer Anzahl ver-
treten als die beiden anderen Arterientypen, am häufigsten
ist A_4 noch an der Subcutis/ Cutisgrenze. Innerhalb der
mittleren Septen, am Rand der Subcutisläppchen und unterhalb
der Fascie ist sie überhaupt nicht zu finden.

In Diagramm 2 zeigt sich, wie sich die V e n e n - von der
Arterienverteilung unterscheidet :

- V_2 - Vene mit Längsmuskulatur in der A d v e n t i t i a -
ist in sämtlichen Schichten in größter Zahl vorhanden,
mit einem enormen Maximum an der Cutis/ Subcutisgrenze.
- V_3 - Vene mit i n n e r e r und ä u ß e r e r L ä n g s -
muskulatur - ist in viel geringerer Zahl vorhanden
(das Maximum ist ebenfalls in der Cutis/ Subcutisgrenze),
während
- V_4 - Vene mit K l a p p e n a n s a t z - nur vereinzelt
in den oberen Septen und über der Fascie vorkommt.

2. Die Dichte der Gefäßversorgung in

den einzelnen Hautabschnitten ist folgendermaßen:

In der Cutis/ Subcutisgrenze befinden sich 33% aller gefundenen Gefäße, außer A_1 und V_1 , die nicht gezählt werden konnten.

intraseptal (oben)	17%
intraseptal (mitte)	12%
intraseptal (unten)	11%
intralobär (Zentrum)	11%
perifascial (oben)	8%
intralobär (Rand)	4%
perifascial (unten)	3%
subfascial	1%

Davon sind, wie Diagramm 3 (Arterien) und Diagramm 4 (Venen) zeigt, in der

Cutis / Subcutisgrenze in weitaus größter Zahl A_2 von allen Arterien vertreten, abgesehen von den kleinen A_1 . Mit weitem Abstand folgt A_3 und A_4 . Ebenso verhält sich der Anteil der Venentypen. V_2 in der Cutis/ Subcutisgrenze ist nach den kleinen A_1 und V_1 das am häufigsten gefundene Gefäß überhaupt.

Intraseptal: Die meisten Gefäße sind in den mittleren und die wenigsten in den unteren Septen. An der Spitze steht A_3 und V_3 . Der geringste Anteil liegt bei A_4 und V_4 .

Intralobär: Vor allem liegen die Gefäße im Zentrum u.z. wiederum am meisten A_3 und V_3 .

Perifascial : sind schon bedeutend weniger Gefäße vorhanden.

Hier sind besonders viele V_2 , weniger V_3 ,

A_2 , A_3 , sehr wenig V_4 und A_4 .

subfascial : findet man eigentlich nur V_2 und A_2 ,

andere nur ganz vereinzelt.

b. Von der Regio cruris posterior

wurden von 10 Leichen 18 Excisate angefertigt und pro Excisat wiederum zwei Schnitte im Abstand von 1000μ untersucht.

1. Auch hier wurden die kleinen A_1 und V_1 nicht berücksichtigt, die in allen Schichten in großer Anzahl vertreten sind.

Diagramm 5 ist die graphische Darstellung für die Verteilung der einzelnen Arterientypen in der Haut in der Regio cruris posterior. Sie zeigt

A_2 - mittelgroße Arterien mit einzelnen Längsmuskelfasern zwischen Intima und Media - ist hier ebenfalls wie in der Regio cruris anterior an der Cutis / Subcutisgrenze am häufigsten zu finden, dann in den mittleren Septen und über der Fascie. Es folgt der Anteil peripher in den Subcutisläppchen und in deren Zentren. Sehr gering ist die Menge, die in den oberen und unteren Septen liegt und subfascial ist A_2 garnicht zu finden.

A_3 - Arterie mit sehr stark entwickelter Längsmuskulatur - ist im Gegensatz zur Regio cruris anterior in den mittleren Septen am häufigsten, dann mit einigem Abstand zu gleichen Teilen in den unteren Septen und intralobär am Rand. Erst dann folgen die Zentren der Läppchen und die Cutis / Subcutisgrenze, dann die oberen Septen und der ganz geringe Anteil oberhalb und unterhalb der Fascie.

A₄ - Arterie mit innerer und äußerer Längsmuskulatur - ist sehr wenig vorhanden.

Diagramm 6 zeigt, daß man bei den Venen ebenfalls wie in der Regio cruris anterior

V₂ - Vene mit Längsmuskulatur in Adventitia - in sämtlichen Lagen in größter Zahl findet, hier aber mit noch imponierenderem Maximum in der Cutis/ Subcutisgrenze.

V₃ - Vene mit innerer und äußerer Längsmuskulatur - ist hier etwas weniger zu finden als vorn, aber ebenfalls mit der größten Häufigkeit an der Cutis/ Subcutisgrenze. Gänzlich vorhanden ist sie intralobär (Rand) und unter der Fascie.

V₄ - Vene mit Klappenansatz - ist nur in den oberen Septen in ganz geringer Zahl vertreten wie in der Regio cruris anterior.

2. Die einzelnen Hautabschnitte sind in der Regio cruris posterior folgendermaßen versorgt :

In der Cutis/ Subcutisgrenze befinden sich 35% aller gefundenen Gefäße, außer A₁ und V₁, die nicht gezählt werden konnten.

Intraseptal (mitte)	16%
Intraseptal (unten)	12%
Intralobär (Zentrum)	10%
Intraseptal (oben)	8%
Intralobär (Rand)	8%
Perifascial (oben)	6%
Perifascial (unten)	3%
Subfascial	2%

Davon sind, wie Diagramm 7 (Arterien) und Diagramm 8 (Venen) zeigen, ebenfalls wie in der Regio cruris anterior die Cutis/Subcutisgrenzen am gefäßreichsten, während subfascial die wenigsten Gefäße vorhanden sind.

Die Cutis / Subcutisgrenze besitzt vor allem A_2 weniger A_3 keine A_4 . Bei den V e n e n ist V_2 in weitaus größter Zahl vorhanden. Mit großem Abstand folgt V_3 .

Intraseptal : Die meisten Gefäße findet man in den mittleren Septen, die wenigsten in den oberen. A_3 und V_2 ist am häufigsten vorhanden. Der geringste Anteil besteht an V_4 und A_4 .

Intralobär : Die Gefäße liegen hier etwas häufiger am Rand. A_3 und V_2 liefert den Hauptanteil.

Perifascial : Auch hier sind wie in der Regio cruris anterior die Gefäße ziemlich spärlich. V_3 und A_3 sind sehr wenig, V_4 garnicht, V_2 am häufigsten zu finden

Subfascial : Nur vereinzelt A_3 und V_2 .

Von allen gefundenen Gefäßen konnten 0,6 % kleinere (G_1) und 1 % größere (G_2) Gefäße, die sich ausschließlich in der Cutis / Subcutisgrenze und in den Septen befanden, nicht differenziert werden.

c. Arteriovenöse Anastomosen (bei 500 Schnitten).

Der geringe Befund an arteriovenösen Anastomosen (bei 500 Schnitten 2 in der Regio cruris posterior und 1 in der Regio cruris anterior) bestätigt die Untersuchungen von P a t z e l t , B a r g m a n n , C l a r a , wonach an der Unterschenkelhaut des Menschen nur eine ganz geringe Anzahl von Anastomosen vorhanden sein soll.

C. Zusammenfassung.

Es wird die Frage nach der Gefäßverteilung in der Haut am Unterschenkel des Menschen durch systematische histologische Untersuchungen angegangen.

Es wurden 10 Leichen verschiedenen Alters und Geschlechts je zwei Hautstückchen von circa 1,5cm - 2 cm Größe aus der Regio cruris anterior und der Regio cruris posterior entnommen und untersucht, mithin also insgesamt 40 Excisate gemustert. Pro Excisat wurden 10 Schnitte von 20μ Schnittstärke bei einem jeweiligen Zwischenraum von 120μ - 180μ angefertigt und teils nach van Gieson, teils auf Elastica-darstellung gefärbt. Von den 10 Schnitten eines Excisates wurden jeweils zwei im Abstand von 1000μ - 2000μ untersucht.

Die Todesstunde der verwendeten Leichen lag niemals länger als 20 Stunden zurück. Die Todesursache schloß bei allen pathologischen Gefäßveränderungen aus.

Die einzelnen Schnitte wurden hinsichtlich der Gefäßverteilung in folgenden Arealen untersucht:

Subcutis/ Cutisgrenze, intraseptal - oben, intraseptal-mitte, intraseptal - unten, intralobär - Zentrum, intralobär-Rand, perifascial-oben, perifascial-unten, subfascial.

An Gefäßen fand man:

Kleine Arterien mit einer dicken Lage von Ringmuskulatur, mittlere Arterien mit einzelnen Längsmuskelbündeln zwischen Intima und Media, Ringmuskulatur und kollagenen Fasern, Arterien mit sehr stark entwickelter Längsmuskulatur und Arterien mit innerer und äußerer Längsmuskulatur; ferner kleine Venen mit einer dünnen Lage glatter Ringmuskulatur, Venen mit Längsmuskulatur in der Adventitia, Venen mit innerer und äußerer Längsmuskulatur und Venen mit Klappenansatz.

Ergebnisse:

1. Zwischen den beiden untersuchten Schnitten (Zwischenraum 1000μ - 2000μ) sind in der Gefäßverteilung kleine

Unterschiede zu finden, die vom Verlauf des Gefäßes und seiner Verzweigung innerhalb dieser Strecke abhängig sind.

2. Hinsichtlich Alter, Geschlecht und Gefäßarchitektonik konnten keine auffälligen Korrelationen in den einzelnen Hautschichten gefunden werden.
3. Kleine Arterien mit einer dicken Lage glatter Ringmuskulatur und kleine Venen mit einer dünnen Lage glatter Ringmuskulatur kommen in sehr großer Anzahl in sämtlichen Hautschichten vor. Sie wurden deshalb bei der statistischen Auswertung vernachlässigt.
4. An der Cutis / Subcutisgrenze befinden sich die meisten Gefäße (33 % - 35 % aller gefundenen Gefäße), besonders Arterien mit einzelnen Längsmuskelbündeln zwischen Intima und Media und Venen mit Längsmuskulatur in der Adventitia.
5. Subfascial sind Gefäße aller Art am spärlichsten anzutreffen.
6. Mittlere Arterien mit einzelnen Längsmuskelbündeln zwischen Intima und Media sind am häufigsten in der Cutis / Subcutisgrenze, dann in den Septen und über der Fascie vertreten. Subfascial ist diese Arterienart garnicht zu finden.
7. Arterien mit sehr stark entwickelter Längsmuskulatur sind ebenfalls häufig vorhanden besonders in den mittleren Septen. Subfascial erreicht die Kurve bei der graphischen Auswertung die 0- Linie.
8. Arterien mit innerer und äußerer Längsmuskulatur sind in viel geringerer Anzahl vertreten als die anderen Arterientypen.
9. Venen mit Längsmuskulatur in der A d v e n t i t i a sind in sämtlichen Schichten in größter Anzahl vorhanden, ganz besonders in der Cutis / Subcutisgrenze.
10. Venen mit innerer und äußerer Längsmuskulatur findet man in viel geringerer Anzahl. Das Maximum liegt ebenfalls in der Cutis / Subcutisgrenze.

11. Venen mit Klappenansätzen kommen nur vereinzelt in den oberen Septen und über der Fascie vor.
12. Hinsichtlich der Gefäßverteilung der Regio cruris anterior und Regio cruris posterior sind keine auffälligen Unterschiede festzustellen.
13. Arteriovenöse Anastomosen sind in der Unterschenkelhaut des Menschen in verschwindend kleiner Anzahl vorhanden. In 500 untersuchten Schnitten befanden sich 3 arteriovenöse Anastomosen u.z. 1 in der Regio cruris anterior und zwei in der Regio cruris posterior.
14. Nur 0,6% kleinere und 1% größere Gefäße konnten nicht sicher genug Arterien oder Venen zugeordnet werden.

D. S c h r i f t t u m .

- Bargmann, W. Histologie und Mikroskopische Anatomie des Menschen
2. Aufl. 1956, Georg Thieme Verlag Stuttgart.
- Benninghoff, A. Blutgefäße und Herz, Handbuch der Mikroskopischen Anatomie des Menschen
Bd. VI / 1 (1930)
- Clara, Max Die Arteriovenösen Anastomosen
2. Aufl. , Wien, Springer Verlag, 1956
- Gottron, H.A. u. Korting, G.W., Zur Pathogenese des Myxödema circumscriptum tuberosum.
Archiv für Dermatologie und Syphilis,
195. Band, Berlin, Verlag von Julius Springer, 1952.
- Hoepke, H. Histologische Technik der Haut.
Berlin, Verlag von Julius Springer, 1930.
- Luckner, H. Die Funktionen der arteriovenösen Anastomosen.
In Barthelheimer Kückmeister, Kapillaren u. Interstitium, Thieme Verlag, Stuttgart, 1955.
- Nödl, F. Die arteriovenösen Anastomosen bei Hauterkrankungen.
Dermatol. Wochenschrift 135, Heft 19, S. 465, 1957.
- Patzelt, Viktor, Histologie, der Feinbau des menschlichen Körpers und seine Entwicklung.
3. Aufl., 1948, Verlag Urban & Schwarzenberg, Wien.
- Ratschow, M. Die peripheren Durchblutungsstörungen
Mediz. Praxis, Band 27, 5. Aufl.,
Verlag von Theodor Steinkopff, Dresden und Leipzig, 1953.

Spalteholz, W. Blutgefäße der Haut, in Jadassohn, I.,
Handbuch der Haut und Geschlechtskrankheiten.
1. Band, 1. Teil.
Berlin, Verlag von Julius Springer, 1927.

Wilbrandt, W. und Lauterburg, H. Zur Frage des Gewebsdruckes
und der physiologischen Bedeutung der arterio-
venösen Anastomosen.
Pflügers Archiv 251, S. 225 - 229, (1949).

E. Lebenslauf.

Ich, E v e l i n J o s t e n , wurde am 19. Juni 1934 als Tochter des Regierungsinspektors Robert Josten und seiner Ehefrau Elsbeth, geb. Körber, in Kreuzburg geboren. Von 1940 - 1944 besuchte ich die Volksschule in Kreuzburg, im Anschluß daran bis Januar 1945 dort die erste Klasse der Mädchenoberschule und von 1946 - 1953 das Mädchenrealgymnasium in Bamberg. Dort legte ich nach Abschluß der 9. Klasse 1953 die Reifeprüfung ab.

Im Wintersemester 1953 nahm ich an der Universität Erlangen das Studium der Medizin auf und bestand dort im Februar 1956 die ärztliche Vorprüfung.

Das erste klinische Semester hörte ich an der Universität Freiburg, die folgenden verbrachte ich an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Hier legte ich auch im Frühjahr 1959 das Staatsexamen ab.

Dem Direktor der Dermatologischen Klinik und Poliklinik der
Universität M ü n c h e n , Herrn Prof.Dr.A. M a r c h i o -
n i n i , danke ich ergebenst für die Arbeitsmöglichkeit in
seinem Haus.

Aufrichtigen Dank schulde ich Herrn Prof. Dr. H. W. S p i e r
für die Stellung des Themas und die liebenswürdige Anleitung
bei der Ausführung.

